



doi:10.3978/j.issn.1005-6947.2015.11.027

http://dx.doi.org/10.3978/j.issn.1005-6947.2015.11.027

Chinese Journal of General Surgery, 2015, 24(11):1630-1632.

III

30

733000

			III		
	30	II			III
		2	6.67%		3
		2	6.67%		15-45
		170 min			3 mm
					26
	/		III		/
	R737.9				
				1.2	
				1.3	
(1)	(2)				8-10 c
	III		20%		90°
	III				Halsted
2013	6	-	2015	3	30
					II
					III
					1
1					
1.1					
	2013	6	-	2015	3
					30
II				35-60	II _A
13	II _B	17			43.3

2015-08-27

2015-10-19

Email: wuweilw@163.com

- -

III

III

2

2.1

30

170 min

2 6.67%

3 10.0%

III

III

III

III

2.2

15~45

3 26 III

3~12 6.5 III

21.74% II_A 13

II_B 17

2.3

2015 7 30

100% 2 6.67%

1 Rotter

3

[3]

[4]

III

Level-III

[5]

III

II

Auchincloses

Patty [6]

III



doi: 10.3760/cjgs1000-9582.2014.01.011
http://dx.doi.org/10.3760/cjgs1000-9582.2014.01.011
Chinese Journal of General Surgery, 2014, 49(1): 11-12



P 11

P 12



收稿日期: 2013-12-10
修回日期: 2014-01-06
通信作者: 王强, 教授, 主任医师
E-mail: wangqiang1958@163.com

1 资料与方法

1.1 病例选择
2012年10月至2013年10月, 我院普外科收治的10例原发性肝癌患者, 均经病理学证实。其中男8例, 女2例, 年龄45~75岁, 平均62.5岁。术前均经影像学检查确诊。所有患者均签署知情同意书。

1.2 手术方法
患者取仰卧位, 常规消毒铺巾。取右肋缘下切口, 逐层切开, 游离肝周韧带, 显露肝脏。根据术前影像学检查结果, 确定肿瘤位置及大小。术中注意保护肝门血管及胆管。肿瘤完整切除后, 创面电凝止血, 放置引流管, 逐层缝合切口。

1.3 术后处理
术后给予抗感染、保肝、利尿等治疗。密切观察生命体征及腹部体征。术后第3天开始进食流质饮食, 逐渐过渡到半流质、软食。术后第5天出院。随访3个月, 无复发及转移。

2 结果
10例患者均顺利完成手术, 无术中死亡。术后并发症发生率为10%。随访3个月, 无复发及转移。

引用本文: 王强, 李强, 张强, 等. 原发性肝癌的手术治疗. 中华普通外科杂志, 2014, 49(1): 11-12.
Cite this article as: Wang Q, Li Q, Zhang Q, et al. Surgical treatment of primary liver cancer. Chinese Journal of General Surgery, 2014, 49(1): 11-12.
doi: 10.3760/cjgs1000-9582.2014.01.011